

# NIKKO

第3類医薬品

# エタノールG

殺菌消毒剤

500mL

飲用不可

貯法：火気を避けて室温保存  
使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)  
注意：保管及び取扱い上の注意の項参照



製造販売元  
日興製薬株式会社  
岐阜県羽島市江吉良町1593

使用に際して、この説明文をよくお読み下さい。

#### 【使用上の注意】

##### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)  
次の部位には使用しないこと。  
粘膜(口唇等)、目の周囲、傷口

##### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (3) 患部が広範囲の人。
  - (4) 深い傷やひどいやけどの人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

#### 【効能・効果】

手指・皮膚の殺菌・消毒

#### 【用法・用量】

塗擦又はガーゼ、脱脂綿等に浸して拭拭する。

#### ＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないこと。
- (3) 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。
- (4) 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
- (5) 小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (6) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、直ちに眼科医の診療を受けること。
- (7) 外用にのみ使用し、内服しないこと。

#### 【組成・性状】

有効成分	エタノール(C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O)	76.9～81.4vol%
添 加 物	イソプロパノール(溶剤)	4.9vol%
	グリセリン(湿潤剤)	0.9W/V%
性 状	無色透明の液で、特異なにおいがある。	

#### ＜成分に関連する注意＞

アレルギーテストの検査を受ける場合には、本剤を使用していることを医師に知らせること。(アレルギーテストの検査値に影響をおよぼすことがある。)

#### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 火気に近づけないこと。
- (5) 開封時、容器の肩部又は底部を持ち、液がとびださないように、キャップを開けること。

#### 【お問合せ先】

日興製薬株式会社 品質管理部  
岐阜県羽島市上中町一色467-1  
TEL.058-398-2576

#### 副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)

#### 火気厳禁

第4類

アルコール類

水溶性

危険等級Ⅱ



容 器：PE  
キャップ：PP

製造番号

使用期限