

NIKKO

日本薬局方
オキシドール

OXYDOL

第3類医薬品

100mL

製造販売元
日興製薬株式会社
岐阜県羽島市江吉良町1593

使用に際してこの説明文をよくお読み下さい。

【使用上の注意】

【してはいけないこと】

(守らないと重症の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
長期連用しないこと

【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

①医師の治療を受けている人。②薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。③患部が広範囲の人。④深い傷やひどいやけどの人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【成分・分量】過酸化水素2.5～3.5w/v%
添加物としてフェナセチンを含有。

【効能・効果】傷の消毒・洗浄

【用法・用量】

そのままの液又は2～3倍に水でうすめた液を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部を洗う。

【用法・用量に関連する注意】

①用法・用量を厳守すること。②顔面など皮膚の敏感な個所に適用する場合には、はじめは低濃度から開始すること。③小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとで使用させること。④目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には直ちに眼科医の診療を受けること。⑤外用にのみ使用し、内服しないこと。

【保管及び取扱い上の注意】

①直射日光の当たらないなるべく冷所(30℃以下)に密栓して保管すること。②小児の手の届かない所に保管すること。③他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になり品質が変わる。)④保存中に瓶内の圧力が高くなっていることがあるので瓶口を顔にむけぬようにして、キャップをあげることを。

【お問合せ先】

日興製薬株式会社 品質管理部
岐阜県羽島市上中町一色467-1 TEL 058-398-2576

【副作用被害救済制度 ☎0120-149-931】

製造番号、使用期限・底面記載 上段・製造番号 下段・使用期限



容 器：PE
キャップ：PP